

## NOTE XII.

UEBER EINE NEUE TRERON-ART VON DEN  
KANGAAN-INSELN

VON

**Dr. O. FINSCH.***Treron Vordermani*, n. sp.

*T. griseicauda* Vorderm. (nec Gray), Nat. Tijdschr. Ned. Ind. LII, 1893, p. 202 (Kangean-Arch.).

Unterscheidet sich von *T. griseicauda* Gray (von Java) durch folgende Kennzeichen: der ganze Ober- und Hinterkopf, nebst den Kopfseiten sind (in beiden Geschlechtern) zart licht aschgrau (nicht dunkelgrau), auf Kinn und Oberkehle noch heller ins Graulichweisse übergehend; die Unterseite (wie beim Weibchen der Rücken) sind heller grün, mehr ins Gelbgrüne; der hintere Bürzel und die oberen Schwanzdecken sind (in beiden Geschlechtern) lebhaft olivengelbgrün (wie bei *T. axillaris* Gray); das helle Ende der äusseren Schwanzfedern ist oberseits graulichweiss (nicht dunkelgrau) und scharf von der schwarzen breiten Querbinde abgesetzt; ausserdem ansehnlich grösser als *T. griseicauda*.

Al.	167 mm.	♂	<i>Vordermani</i> .
»	160	♀	»
»	146—155	♂	<i>griseicauda</i> .
»	145—147	♀	»

H a b. Kangean-Inseln.

Nach einem alten Männchen und Weibchen (»Ardjaso, Mai 1892), welche das Reichs-Museum durch Güte von Herrn A. G. Vorderman erhielt. Ich benenne diese Art nach dem unermüdlichen und verdienten Forscher, dem wir u. A. auch die nähere Kenntniss der Vögel der Kangean-Inseln zu verdanken haben.

Leidener Museum, Juni 1900.